

Bilaga 2. Glömd dos av antikoagulantia (Waran/Pradaxa/Xarelto/Eliquis)

Warfarin (Waran)

Om det är mindre än 12 timmar efter glömd dos – ta snarast den glömda dosen. Vid nästa doseringstillfälle dos enligt ordination.

Om det är mer än 12 timmar efter glömd dos – ta snarast halva den glömda dosen. Vid nästa doseringstillfälle dos enligt ordination.

Om glömd dos upptäcks i samband med nästa ordinationstillfälle - ta halva den glömda dosen tillsammans med den nya dosen.

Vid misstanke, men osäkerhet om glömd dos – avstå. Vid nästa doseringstillfälle dos enligt ordination.

Pradaxa (Dabigatran)

Glömd tablett tas snarast om det är mer än 6 timmar kvar tills nästa ordinarie dos. Om det är mindre än 6 timmar kvar till nästa ordinarie dos hoppa över den glömda tabletten och ta nästa ordinarie dos som vanligt.

Xarelto (Rivaroxaban)

Vid dosering en gång per dag tas den glömda tabletten omedelbart om det är under samma dag. Fortsätt följande dag enligt ordination.

Vid dosering två gånger per dag (gäller 15 mg x 2) tas den glömda tabletten omedelbart för att få dygnsdosen 30 mg/dag. Fortsätt följande dag enligt ordination.

Eliquis (Apixaban)

Glömd tablett tas snarast, även om detta innebär så sent att tabletten tas i samband med nästa dosstillfälle, dvs att två tabletter då intas samtidigt. Fortsätt därefter enligt ordination.

Lixiana (Edoxaban)

Om en dos av Lixiana missas, ska dosen tas omedelbart och därefter fortsätter patienten följande dag med intag en gång dagligen enligt ordination. Patienten ska inte ta dubbel ordinerad dos samma dag för att kompensera för en glömd dos.

Rekommendationerna baseras på en kombination av FASS-texter, SSTH:s riktlinjer och vetenskapligt underlag.

Koagulationsmottagningen US/Koagulationskonsult

Universitetssjukhuset i Linköping